

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Przyjęcie i zabieg w dniu /..... / 202

P.

W związku z planowanym zabiegiem operacyjnym w tutejszym Szpitalu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Przy pierwszej rejestracji otrzymacie Państwo, oprócz niniejszej Informacji, **ankietę anestezyjologiczną**, którą należy przeczytać w domu. Informacje zawarte w ankiecie anestezjolog zapisze w trakcie konsultacji przedzabiegowej (p. dalej).
2. **W czasie wizyty wstępnej należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach przewlekłych** (zwłaszcza chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach tarczycy), przebytych zabiegach operacyjnych i zażywanych lekach (zaleca się przygotować listę (link przegląd lekowy on-line)).
3. **Chorzy przyjmujący leki zmniejszające krzepliwość krwi** takie jak:

Leki przeciwplatekcyjne:

Kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard),

Klopidogrel (np. Agregex, Areplex, Plavix, Carder, Clopidix, Duoplavin, Vixam, Zylt), Tikagrelol (np. Brilique),

Tiklopidyna (np. Aclotin, Ifapidin, Iclopid, Apo-Clodin),

Cilostazol (Cilostop, Cilozek, Decilozal, Noclaud, Stepcil)

Doustne leki przeciwkrzepliwe:

Acenokumarol (np. Acenokumarol WZF, Sintrom),

Warfaryna (np. Warfin),

Dabigatran (Pradaxa),

Rywaroksaban (Xarelto),


Apiksaban (Eliquis)

Heparyny drobnocząsteczkowe:

Enoksaparyna (Clexane, Neoparin),


Nadroparyna (Fraxiparine, Fraxodi),

Dalteparyna (Fragmin)



powinni poinformować o tym lekarza w Poradni przy wizycie wstępnej. Ze względu na bezpieczeństwo podczas operacji konieczne może być odstawienie lub zmiana tych leków na inne nawet do 10 dni przed zabiegiem. Decyzję o tym podejmuje lekarz prowadzący (lekarz rodzinny, internista, kardiolog). Nie wolno samodzielnie odstawiać leków! Na 2-3 dni przed planowanym terminem zabiegu należy wykonać badanie układu krzepnięcia (INR i APTT).

4. Podczas wizyty otrzymają Państwo pisemną informację o rodzaju proponowanego zabiegu, oraz metodach alternatywnych w stosunku do proponowanego sposobu postępowania. Bardzo prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który posłuży Lekarzowi w ustaleniu wskazań, przeciwwskazań oraz indywidualnego planu leczenia.
5. **Przed przybyciem do szpitala rano w dniu zabiegu należy się wykąpać.**
6. Pacjenci kwalifikowani do wycięcia pęcherzyka żółciowego proszeni są o dokładną toaletę pępka, następnie założenie do pępka na noc poprzedzającą zabieg gazika nasączonego Octeniseptem, przymocowanego plastrem.
7. **Pacjent musi być na czczo – bez śniadania. Można przyjmować klarowne płyny (woda, herbata) w dowolnej ilości do godziny 6 rano w dniu zabiegu.**
8. **W dniu przyjęcia proszę się zgłosić w Rejestracji o wyznaczonej godzinie.** Pacjenci przyjmowani są w kolejności wg rozpisu zabiegów w danym dniu.
9. **Chorzy na cukrzycę leczone lekami doustnymi albo insuliną w dniu zabiegu: nie zażywają leków przeciwcukrzycowych, ani nie podają sobie samodzielnie insuliny we wstrzyknięciu!**
10. **Leki stosowane przewlekłe (oprócz wyżej wymienionych w pkt. 9) należy przyjąć rano w dniu zabiegu (do godziny 6) – w szczególności leki kardiologiczne – popić wodą niegazowaną/herbatą.** W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza w Poradni.
11. **Do zabiegu należy zgłosić się wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami osobistego użytku.**
W szczególności proszę **pozostawić w domu** biżuterię, większe sumy pieniędzy, karty kredytowe itp. Do Państwa dyspozycji są **szafki zamykane na klucz** (podczas hospitalizacji istnieje możliwość skorzystania z depozytu).



Rzeczy osobiste powinny być zapakowane w niewielką torbę zamykaną na zamek błyskawiczny.

12. Chorzy na cukrzycę powinni zabrać ze sobą słodzony napój/cukierki do ssania na wypadek hipoglikemii.

13. Odzież na zmianę powinna być wygodna i praktyczna wskazana jest bawełniana, dwuczęściowa. Najwygodniejszym i najbardziej praktycznym obuwiem w szpitalu są plastikowe klapki z antypoślizgową podeszwą, w których można także wejść pod prysznic.

14. W kosmetyczce powinny się znaleźć podstawowe przybory toaletowe, takie jak pasta i szczoteczka do zębów, krem do twarzy, szampon do włosów, żel pod prysznic. Tradycyjne mydło w kostce nie sprawdza się w szpitalu. Lepsze jest mydło w płynie. W szpitalu nie używamy gąbki, która zwykle jest siedliskiem drobnoustrojów.

15. Kobiety, które malują paznokcie, przed przyjściem do szpitala powinny zmyć lakier. Podczas zabiegu pacjent jest stale obserwowany. Pogorszenie jego stanu może się objawiać sinieniem paznokci. Nałożony ciemny, matowy lakier, hybrydy, tipsy mogą przyczynić się do przeoczenia ważnego sygnału.



BADANIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

(wyłącznie punkty zakreślone przez lekarza)

- ☐ RTG płuc: / jeśli pacjent wykonał rtg płuc w ciągu 6 miesięcy poprzedzających planowany termin zabiegu, należy to zgłosić lekarzowi w tutejszej Poradni
 - ☐ EKG i opinia lekarza internisty/medycyny rodzinnej o braku internistycznych przeciwwskazań do planowego leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym; pacjenci pozostający w kontroli kardiologicznej przedstawiają opinię kardiologa, endokrynologicznej opinię endokrynologa, pulmonologicznej opinię pulmonologa
 - ☐ Pozostałe konsultacje (endokrynologiczna, hematologiczna, pulmonologiczna) w razie wskazań
-

- ☐ Badanie ginekologiczne /w przypadku kobiet / ☐ Badanie stomatologiczne (wykluczenie ognisk zapalnych)
- ☐ BADANIA KRWI są pobierane w dniu/...../202..... (wyłącznie punkty zakreślone przez lekarza)
- ☐ Morfologia krwi, jonogram (Na, K), układ krzepnięcia (INR, APTT)
- ☐ Grupa krwi (honorowane są odrębne zaświadczenia Pracowni Serologicznych o grupie krwi; informacje na temat grupy krwi zawarte w szpitalnych kartach informacyjnych nie są akceptowane)
- ☐ mocznik, kreatynina ☐ badania wątrobowe (AlAT, AspAT, fosfataza alkaliczna, GGTP, bilirubina)
- ☐ HBs antygen (w przypadku chorych nie szczepionych przeciwko WZW typu B) ☐ Anty-HCV
- ☐ TSH, fT3, fT4 ☐

Krew na badania przed planowanym zabiegiem pobiera się w pokoju zabiegowym ambulatorium Szpitala w wyznaczonym przez lekarza terminie. Należy zgłosić się na czczo w godzinach 8.00- 9.00 bezpośrednio do pokoju zabiegowego okazując niniejszy dokument, będący jednocześnie skierowaniem na badania.

